

ПОЛИКЛИНИКА



Определение группы риска ССЗ



Vasera VS-1500N

1. Показатели АД и асимметрии АД (не более 10 мм.рт.ст)
2. ССЛИ (CAVI) + индекс аугментации AI-R + биологический возраст
3. Дополнительные показатели стеноза артерий (UT, %MAP)
4. Показатели сократительной функции миокарда (ET, PEP, PEP/ET)
5. 2-е отведение ЭКГ+ ФКГ
6. ЛПИ (АВI) + ППИ (ТВI)

СТАЦИОНАР, СПЕЦИАЛИСТ ПОЛИКЛИНИКИ

Кардиолог

Выявленные БСК

Оценка состояния сосудистой стенки, оценка динамики лечения

Первичная

Первичная оценка параметров работы ССС

Прием терапевта

Имеет в анамнезе: повышенное АД, иные факторы риска ССЗ

Первичная оценка параметров работы ССС

Прохождение диспансеризации, профосмотра

Выявление доклинических форм атеро-(артерио-) склероза, стеноза сосудов нижних конечностей

Низкий Риск

Наблюдение терапевта, при необходимости коррекция образа жизни и питания

Контроль динамики параметров (2, 6) через 4-6 месяцев

Нефролог, пульмонолог, эндокринолог

Выявление рисков наличия сердечно-сосудистых осложнений у больных указанного профиля

Высокий Риск

Анализ анамнеза, верификация диагноза дорогостоящими методами, постановка диагноза, назначение лечения

Контроль динамики лечения (2, 6) через 4-6 месяцев

Невропатолог, хирург

Оценка риска внезапных острых ишемических состояний, выявление стенозов, сосудов нижних конечностей